

Therapien

Es besteht Anspruch auf gezielte Fördermaßnahmen, eine spezielle kausale Therapie gibt es bei „FASD“ allerdings nicht. Kinder können ihre Fähigkeiten in Teilbereichen mit therapeutischer Unterstützung verbessern:

- Physiotherapie
- Frühförderung
- Ergotherapie
- Logopädie
- Motopädie
- Verhaltenstherapie
- Sensorische Integration
- Reittherapie/Hippotherapie
- Musiktherapie
- Medikamentöse Therapie
- Homöopathie
- Ernährungsberatung
- Päpki®
- Castillo Morales®
- Neurofeedback

Die Kinder und Jugendlichen mit FASD brauchen ein wohlwollendes und verständnisvolles sowie gewaltfreies Umfeld. Hilfreich sind klare Strukturen und Grenzen mit transparenten Konsequenzen.

FASD – eine Behinderung, die zu 100 % vermeidbar ist.

Mehr Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Thema „FASD“ finden Sie unter:

www.bzga.de

Weitere Informationen zum Thema „Gesundheit“ finden Sie unter:

www.bkk-diakonie.de

Social Media   

BKK Diakonie

Königsweg 8 | 33617 Bielefeld | Telefon: 0521.329876-120
Fax: 0521.329876-190 | E-Mail: info@bkk-diakonie.de
www.bkk-diakonie.de

www.bkk-diakonie.de

FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorders

BKK Diakonie 
Krankenkasse für soziale Berufe

Sicherheit
bringt nur der
absolute Alko-
holverzicht!

Schon ein Glas
Alkohol kann
unwiderruflich
schädigen!

Alkohol
ist ein
Zellgift!

FASD –

Diagnose und Therapie

www.bkk-diakonie.de

Übersicht Diagnosekriterien

Mindestens eine Wachstumsauffälligkeit

- Geburts- oder Körpergewicht

oder

- Geburts- oder Körperlänge

oder

- Body-Mass-Index < 10. Perzentile

Alle drei FASD-typischen fazialen Auffälligkeiten

- Kurze Lidspalte

und

- Fehlende Rinne zwischen Mund und Nase

und

- Schmale Oberlippe

Mindestens eine ZNS-Auffälligkeit

- Mikrozephalie

oder

- Intelligenzminderung bzw. Entwicklungsverzögerung < 2 Jahren

oder

- Verminderte Leistungen in mind. drei Bereichen

oder

In mind. zwei Bereichen und Epilepsie:

- Sprache
- Feinmotorik
- Räumlich-visuelle Wahrnehmung
- Exekutive Funktionen
- Rechenfertigkeiten
- Lern- oder Merkfähigkeit
- Aufmerksamkeit
- Soziales Verhalten

> Sind alle drei Kriterien erfüllt, handelt es sich um das FASD-Vollbild.

FASD

Nur ein geringer Teil der FASD-Menschen ist dem klassischen Vollbild zuzuordnen. Etwa 70 bis 80 % aller Betroffenen haben keine äußerlich sichtbaren klinischen Erkennungsmerkmale.



FASD-Puppe FASI von www.ana-tomie.de

Buchstäblich ins Gesicht geschrieben.

Je nach Entwicklungsphase kann Alkohol eine unterschiedlich schädigende Wirkung haben:

- Fehlbildungen von Organen und Skelett
- Herzfehler
- Deformierte Extremitäten
- Schädigung des zentralen Nervensystems
 - Verminderte Zellenanzahl wird angelegt
 - Gedächtnis- und Konzentrationsschwächen, Wahrnehmungsstörungen oder motorische Defizite
- Psychoaktiv wirksame Veränderungen
- Negative Beeinflussung der Informationsverarbeitung und -weiterleitung
 - Wirkt auf die Sensibilität und kognitive Leistungsfähigkeit
- Gestörte Verhaltens- und Emotionssteuerung

Somit erklärt sich, warum FASD in so vielfältigen Ausprägungen vorkommt.



Für eine möglichst günstige Entwicklung der Kinder mit FASD ist eine frühe Diagnosestellung unverzichtbar, um angemessene Hilfen und Unterstützung frühzeitig in die kindliche Entwicklung zu integrieren und vor allem den Eltern und Bezugspersonen qualifizierte Fördermöglichkeiten im Alltag anbieten zu können.